


Avertissements agricoles

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
RHÔNE-ALPES*Arboriculture*

165, rue Garibaldi - Bâtiment B - B.P. 3202 - 69401 LYON Cédex 03

☎ 78.63.25.65

Bulletin n° 17 - 6 Septembre 1989

Carpocapse des pommes et des poires : fin de la protection
Maladies de conservation des pommes et des poires : intervenez dans la semaine précédant la récolte
Tordeuse Orientale - Oïdium et Moniliose sur pêches : maintenez la protection sur les variétés tardives

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Depuis le 30 Août les prises de papillons dans les pièges sexuels sont très faibles, aussi il est inutile de renouveler la protection.

TORDEUSE DE LA PELURE - CAPUA

Le deuxième vol est terminé. Si vous avez observé des dégâts sur fruits (1 % de fruits atteints), envisagez une protection au printemps 1990.

MALADIES DE CONSERVATION DES POMMES ET DES POIRES

Tavelures

Les conditions climatiques actuelles ne favorisent pas les contaminations sur fruits ; toutefois à la suite d'une hygrométrie élevée due à une pluie faible ou à une rosée, une intervention devient nécessaire.

Botrytis - Monilioses

Pour prévenir contre ces champignons intervenez une semaine avant récolte avec l'un des produits suivants :

vinchlozoline	RONILAN	sans délai avant récolte
iprodione	KIDAN - ROVRAL	délai : 1 jour avant récolte
* tolyfluanide	METHYLEUPARENE	délai : 7 jours avant récolte

* fongicide efficace contre les tavelures.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER

L'intensité du vol diminue peu à peu, pour les variétés tardives (pêches sanguines), effectuez une dernière application.

OIDIUM - MONILIA SUR PECHES

Oïdium

Maintenez la protection sur les variétés tardives.

Monilia

Effectuez un traitement avant récolte.

BACTERIOSE DE L'ABRICOTIER

Plusieurs cas de bactérioses ont été signalés en 1989, de ce fait il est indispensable de protéger les jeunes plantations âgées de moins de 5 ans.

Après avoir éliminé les pousses sur les troncs ainsi que sur les 20 premiers centimètres des charpentières, appliquez soit une pulvérisation, soit un badigeon.

- Composition de la pulvérisation :

Après avoir réalisé une pulvérisation cuprique, à raison de 16 g de cuivre métal par litre d'eau, appliquez le mélange suivant :

- . 2 kg de blanc à badigeon
- . 1 kg de peinture vinylique blanche diluable à l'eau
- . 5 litres d'eau

Pour cette application, un pulvérisateur à dos, équipé d'une lance à buse étroite, peut être utilisé.

Quantité de bouillie nécessaire par arbre : 0,1 l à 0,3 l.

- Composition du badigeon :

Appliquez à l'aide d'un pinceau le mélange suivant :

- . bouillie bordelaise (350 g d'un produit à 20 % ou 300 g d'un produit à 25 %)
- . 2 à 3 litres d'eau, puis ajoutez :
- . 2 kg de blanc à badigeon
- . 1 kg de peinture vinylique blanche diluable à l'eau

Dans les vergers où des chancres à Eutypa sont présents, ajoutez au mélange BENLATE à raison de 6 g de produit commercial par litre d'eau.

Sur toutes les plantations, des traitements cupriques seront appliqués dès le début de la chute des feuilles.

TOUS ARBRES FRUITIERS

ACARIENS ROUGES

Une grande partie des oeufs d'hiver a été déposée, aussi il est trop tard pour limiter les pontes.